


| Nr: _____ | Formularz oceny ryzyka | | |  Norsk Landbruksrådgiving | |
|--|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Data: 01.11.2017 | Zadanie: Mleko – wolne stanowisko | | | Uczestnicy: | |
| Źródła niebezpieczeństwa/rozpoznane ryzyko | Prawdopodobieństwo uszkodzenia? S | Konsekwencje uszkodzenia K | Ryzyko S x K | Co można zrobić, aby zmniejszyć konsekwencje? Środki zapobiegawcze | Ryzyko po działaniu S x K |
| Usuwanie obornika | Wysoce prawdopodobne – 5 Nadwyręzenie mięśni | Krytyczne/poważne – 3 Uraz stawów i mięśni | 5 x 3 15 | Bądź świadomy pozycji roboczej, zmieniaj prawą/lewą stronę, pracuj z rękami przy ciele. Na większych obszarach praca powinna być podzielona. Używaj obuwia ochronnego. | 2 x 1 2 |
| Usuwanie obornika z kosza | Bardzo prawdopodobne – 4 Kopnięcie i niebezpieczeństwo | Bardzo poważne – 4 Złamanie, zgniecenie | 4 x 4 16 | Znaj dobrze zwierzęta i bądź świadom niebezpieczeństw. Naucz je procesu, gdy są źrebiętami. Używaj obuwia ochronnego. | 2 x 2 4 |
| Karmienie kiszonką | Wysoce prawdopodobne – 5 Ściśnięcie, rana otwarta | Bardzo poważne – 4 Zgniecenie, rana otwarta | 5 x 4 20 | Bądź świadom niebezpieczeństwa, myśl o tym, gdzie stajesz. Nie stawaj pod balami z kiszonką. Używaj rękawic. | 2 x 2 4 |
| Dojenie | Bardzo prawdopodobne – 4 Ból/dyskomfort pleców, ramion i karku | Krytyczne/poważne – 3 Uraz stawów i mięśni | 4 x 3 12 | Dopasuj wysokość. zwiększ/zmniejsz wysokość podłogi, albo skorzystaj ze stołka. | 2 x 1 2 |
| Opieka nad źrebięciem | Bardzo prawdopodobne – 4 Nadwyręzenia | Krytyczne/poważne – 3 Uraz stawów i mięśni | 4 x 3 12 | Podczas noszenia wiader uważaj, jak to robisz. Lepiej wykonaj kilka kursów. Używaj wózka do mleka. | 1 x 1 1 |